

Achillea (*Achillea spp.*)

Grupo funcional: Herbáceas perennes para flor y follaje

Descripción

Hierba perenne de 0.7 a 1.5 metros de altura, aromática, rizomatosa y de tallos erectos. Hojas alternas, sésiles y pinatisectas.

Inflorescencias que se presentan en capítulos pequeños, reunidos en corimbos que alcanzan los 10 cm de diámetro, de color amarillo, rosado pálido y blanco.

Especie que se cultiva en parques y jardines de la región, florece en primavera y verano.

Usos

Herbácea que suele utilizarse en macizos y canteros combinada con otras especies de herbáceas perennes y florales de estación. Su llamativa floración se diferencia notoriamente de su follaje, creando una capa superficial de colores vivos.

Especie que genera un efecto de movilidad a causa del viento.

Requerimientos

Requiere de sol pleno para su óptimo desarrollo, suelos drenados, arenosos y fértiles.

Para su correcto mantenimiento es necesaria la limpieza de sus flores secas y la poda para el renuevo de su follaje.

Tolerancias

Tolera la sequía y el viento marino, es muy sensible a las bajas temperaturas, que pueden quemar su follaje.

Paleta cromática



Achillea (*Achillea* spp.)

Fase de producción	Descripción
Reproducción por	Por semillas o por división en primavera.
Siembra o enraizamiento	La siembra se realiza en bandejas con sustrato bien drenado, húmedo pero no encharcado, presionando ligeramente las semillas. Por división se realiza en primavera, separando la planta establecida en secciones con raíces de más de 5 cm.
Planta juvenil	Las plantas juveniles se trasplantan en macetas con sustrato ligeros, con espaciamiento adecuado para su hábito expansivo rastrero.
Incremento de tamaño	El engorde en macetas se hace en contenedores para formar plantas que puedan colonizar rápidamente el suelo una vez trasplantadas al lugar definitivo.
Conducción y poda	No se requiere poda alguna, solo limpieza de hojas y tallos si llega a florecer.
Riego y calidad agua	Riego semanal, tolera ligera sequía.
Fertilización	No es muy exigente en fertilización. Aplicar dosis bajas.
Control de malezas	Rápido crecimiento proveniente de división. Controlar sustratos e implementos.
Manejo fitosanitario	Puede verse afectada por áfidos o mildiú.
Transporte / Comercialización	Comercialización en principalmente en bolsas de 2 a 5 lts.

- Material elaborado por el Grupo Disciplinar de Paisaje del Departamento Forestal en el marco del **proyecto Innovagro FSA20241180511**