

Azalea (*Rhododendron spp.*)

Grupo funcional: Arbustos ornamentales

Descripción

Arbusto de 2 a 3 metros de altura, caduco, muy ramificado, de tallos pubescentes e inermes. Hojas simples, alternas de 4 a 10 cm de largo y 1.5 a 3 cm de ancho de color verde inglés, con brotes tiernos verde limón.

Inflorescencias que se disponen en fascículos de 6 a 10 flores, actinomorfas, bisexuales que alcanzan los 6 cm de largo.

Especie nativa de Japón, cultivada en gran parte del mundo en parques y jardines. Florece en primavera.

Usos

Su principal atributo es su floración, aportando luz y color a los espacios. Puede implementarse como ejemplar individual o en grupos, en conjunto con otros arbustos de porte similar. Acepta su cultivo en contenedores siempre y cuando tenga un buen sustrato y reciba una fertilización anual.

Requerimientos

Requiere de sombra ligera a parcial para su óptimo desarrollo, suelos fértiles, drenados y levemente ácidos. Es necesario el agregado de materia orgánica con los cambios estacionales.

Tolerancias

Tolera la sequía y las bajas temperaturas.

Paleta cromática



Azalea (*Rhododendron* spp.)

Manejo	Descripción
Reproducción por	Estaquillas de madera suave, provenientes de tallos apicales. Sólo se reproduce por semilla con fines de mejoramiento.
Siembra o enraizamiento	Tomar las estacas al final del invierno o vernalizarlas, colocarlas en sustrato ácido.
Planta juvenil	Enraizamiento por 4 a 12 semanas en turba y perlita con pH 5,5. Primer pinzado en ese período.
Incremento de tamaño	Se ponen 3 o 4 esquejes enraizados en macetas de 1 litro con sustrato estéril a pH 5. Luego se trasplantan a macetas individuales de 2 o 3 litros. Se usan giberelinas para producir plantas compactas.
Conducción y poda	Eliminar ramas secas y brotes delgados y largos sin brotes laterales. Poda posfloración.
Riego y calidad agua	Mantener alta humedad, suplementando el riego en verano. Controlar el pH del agua, especialmente si la fuente es alcalina.
Fertilización	Baja en otoño y primavera. No fertilizar en verano e invierno.
Control de malezas	Control intensivo por el lento crecimiento inicial.
Manejo fitosanitario	Favorecer la ventilación, asegurar buena nutrición y colocar mulch de pinocha para evitar aparición de enfermedades. Aplicaciones preventivas ante tizones de flor provocados por hongos de los géneros <i>Ovulinia</i> y <i>Botrytis</i> .
Transporte / Comercialización	Comercialización en bolsas de vivero entre 2 y 5 litros de capacidad, con amplia diversidad colores de flor: blanco, rojo, rosado y fucsia, principalmente.

- Material elaborado por el Grupo Disciplinar de Paisaje del Departamento Forestal en el marco del **proyecto Innovagro FSA20241180511**