

Clivia (*Clivia miniata*)

Grupo funcional: Herbáceas perennes para flor y follaje

Descripción

Hierba geófita de 30 a 70 cm de altura en estado adulto, de carácter rizomatosa. Hojas basales, acintadas, sésiles, erectas de 40 cm de largo, de color verde inglés a verde oscuro intenso. Inflorescencia terminal, compuesta de 12 a 20 flores, de escapo erecto de 40 cm de largo. Flores actinomorfas, bisexuales, largamente pediceladas de coloración naranja intenso. Fruto carnoso, subgloboso, de coloración roja. Especie nativa de Sudáfrica, se cultiva como ejemplar ornamental en distintas partes del mundo. Florece en invierno y primavera.

Usos

Muy utilizada para la conformación de macizos, bordes de grandes canteros y cultivo al pie de árboles. Su follaje acintado perenne es muy llamativo. Muy utilizada para romper líneas visuales en construcciones, también como acompañamiento en senderos en combinación con otras herbáceas de porte similar. Se recomienda además su cultivo en macetas. Cabe destacar su floración de invierno, siendo una de las pocas especies que florecen plenamente en esta estación.

Requerimientos

Requiere de suelos bien drenados y fértiles, sombra a media sombra para lograr un ejemplar en óptimas condiciones, la radiación directa en horas de la tarde puede provocar quemaduras en su follaje.

Tolerancias

Heladas suaves, sombra.

Paleta cromática



Clivia (*Clivia miniata*)

Fase de producción	Descripción
Reproducción por	Por división de raíces rizomatosas en los meses de julio a setiembre, luego de la floración. Por semillas: inmediatamente después de cosechadas, lavar con agua tibia y jabón, dejar secar y sembrar.
Siembra o enraizamiento	La división de raíces puede hacerse en terreno abierto, no es necesaria la protección de un invernadero. Por semillas: enterrar bien en un sustrato compuesto por arena de río y compost o mantillo 1-1. Para germinar requiere temperaturas por encima de los 15°C.
Planta juvenil	Un trasplante anual para las obtenidas por semillas, al tercer año pueden ir a su ubicación definitiva. Las provenientes de división se pueden colocar en el lugar definitivo de inmediato.
Incremento de tamaño	Para lograr la floración debe someterse al frío invernal.
Conducción y poda	Retirar hojas secas, las raíces prefieren recipientes pequeños que las constriñen.
Riego y calidad agua	Riegos abundantes en primavera y verano, más espaciados en invierno para evitar podredumbre de raíces.
Fertilización	Cuidar excesos de nitrógeno. Su cultivo en suelos pobres promueve la floración.
Control de malezas	Cubrir con mulch si quedan espacios en maceta hasta que se establezca la nueva mata. Usar sustratos y herramientas limpias.
Manejo fitosanitario	Susceptible a virosis y podredumbres bacterianas, en ambos casos, controlar fertilización nitrogenada, no propagar plantas con síntomas evidentes. Pueden aparecer cochinillas algodonosas que se instalan en las bases de las hojas.
Transporte / Comercialización	Comercialización principalmente en bolsas de 2 lts.

- Material elaborado por el Grupo Disciplinar de Paisaje del Departamento Forestal en el marco del **proyecto Innovagro FSA20241180511**