

Eugenia (*Eugenia myrtifolia*)

Grupo funcional : Arbustos ornamentales

Descripción

Arbusto perenne de crecimiento rápido, cónico y redondeado, muy ramificado. Puede llegar a 10 metros de altura. Corteza escamosa, hojas opuestas, ovaladas, de menos de 5 cm, rojizas en la brotación, luego brillantes verde intenso. Flores blancas pequeñas, globosas. Florece abundantemente en primavera y un poco en otoño. Frutos carnosos, en forma de cereza alargada de color magenta decorativos y comestibles. Nativo de selvas lluviosas costeras del este de Australia.

Usos

Utilizada en cercos vivos en parques y jardines, cultivo en contenedores y topiarios. Sus flores atraen mariposas, sus frutos aves. En épocas de crecimiento, sus brotes rojizos aportan color al entorno.

Requerimientos

Florece más a pleno sol, pero se puede cultivar en semisombra. Suelos bien drenados y ricos en materia orgánica.

Tolerancias

Sequía una vez establecida, bajas temperaturas y heladas ligeras. Especie de bajo mantenimiento.

Paleta cromática



Eugenia (*Eugenia myrtifolia*)

Fase de producción	Descripción
Reproducción por	Esquejes de rama del año, brotes sombreados no apicales. Semillas, que presentan poliembrionía.
Siembra o enraizamiento	Semillas: recién cosechadas. Sustrato con 50% de arena gruesa o perlita, mantener húmedo, a 20-22 °C. Germinación lenta / Esquejes: cortar el ápice y reducir las hojas. Mantener en condiciones de alta humedad. Aplicar enraizantes.
Planta juvenil	Provenientes de semilla: a las 4 hojas verdaderas. Esquejes: a los 2 o 3 meses, cuando desarrollen nuevas hojas.
Incremento de tamaño	Después de 4 a 6 meses del trasplante inicial.
Conducción y poda	Según se le desee dar forma vertical o compacta, en este caso despuntar. Reacciona muy bien a podas. Eliminar ramas secas y con excesivo vigor.
Riego y calidad agua	Evitar excesos hídricos, susceptible a enfermedades de suelo.
Fertilización	Complementar el abonado orgánico con K para estimular la floración.
Control de malezas	Usar sustrato, herramientas y recipientes limpios. Uso de coberturas para sombreado.
Manejo fitosanitario	Controlar la aparición de cochinillas, pulgones y ácaros que generan agallas en las hojas. Los frutos pueden ser atacados por mosca de la fruta. El exceso de riego lo hace susceptible al ataque de hongos del suelo.
Transporte / Comercialización	La comercialización se hace en bolsas de vivero entre 2 y 5 litros de capacidad, dependiendo de la altura de los ejemplares. Durante el transporte las plantas no deben exponerse al sol, vientos ni heladas. Cubrir la carga con lona o toldo para evitar la desecación de las plantas y daño mecánico por viento.

- Material elaborado por el Grupo Disciplinar de Paisaje del Departamento Forestal en el marco del **proyecto Innovagro FSA20241180511**