

Ibirapitá (*Peltophorum dubium*)

Grupo funcional: Árboles ornamentales

Descripción

Árboles de 10 a 30 metros de altura, semiperennifolios, copa amplia, hemisférica tupida. Hojas alternas paripinnadas con hasta 21 pares de pinnas. Flores zigomorfas, amarillas, de 2 a 3 cm en panículas terminales. Frutos legumbres samaroides planas.

Nativa del sur de Brasil, Paraguay, nordeste de Uruguay y de Argentina, se cultiva en zonas cálidas a templadas. Florece en verano, conserva sus hojas hasta el inicio de la primavera.

Usos

Más allá de sus usos forestales, se emplea en parques, calles y avenidas. Especie con valor cultural muy utilizada en centros educativos.

Requerimientos

Sol pleno, suelos húmedos humíferos arenosos o arcillosos, sensible al frío y al exceso hídrico.

Tolerancias

Si se protege durante los primeros años, puede tolerar heladas ligeras una vez desarrollado.

Paleta cromática



Ibirapitá (*Peltophorum dubium*)

Fase de producción	Descripción
Reproducción por	Por semillas escarificadas y previamente remojadas. Por estacas con aplicación de enraizante.
Siembra o enraizamiento	Las semillas pueden almacenarse por períodos de hasta 3 años. Sembrar en bandejas, germina a partir de los 5 días.
Planta juvenil	Transplante con de 2 a 3 pares de hojas verdaderas en caso de semilla o estacas.
Incremento de tamaño	Transplantes sucesivos, siempre en entorno protegido. A los 6 meses de siembra o propagación se puede colocar en macetas de 40 cm de diámetro hasta el momento de llevar al lugar definitivo (a partir de los 9 meses).
Conducción y poda	Poda de formación, en caso de heladas manejar rebrotes por medio de la poda para estimular el crecimiento del tronco principal.
Riego y calidad agua	Controlar pH del agua, evitar aguas alcalinas.
Fertilización	Puede utilizarse mantillo de monte. Si se emplea corteza de pino compostada, agregar de 1 a 3 Kg de fertilizante completo de liberación lenta por m ³ de sustrato. Otra opción es emplear una mezcla de corteza de pino compostada con tierra y arena y la misma dosis de fertilizante.
Control de malezas	Usar sustratos limpios sobre todo en la etapa inicial del cultivo.
Manejo fitosanitario	No presenta problemas mayores de plagas o enfermedades.
Transporte / Comercialización	Comercialización en envase rígido o bolsa de 10 a 45 litros. Durante el transporte, las plantas no deben exponerse al sol, vientos ni heladas, cubriendo la carga con lona o toldo para evitar desecación y daño mecánico por viento.

- Material elaborado por el Grupo Disciplinar de Paisaje del Departamento Forestal en el marco del **proyecto Innovagro FSA20241180511**