

Lapacho rosado (*Handroanthus impetiginosus*)

Grupo funcional: Árboles ornamentales

Descripción

Árboles de hasta de 30 metros de altura, tardíamente caducifolios, copa subglobosa a irregular. Corteza castaño oscura con grietas profundas longitudinales y transversales, dura. Hojas opuestas, palmaticompuestas de 5 folíolos. Flores zigomorfas perfectas, rosadas o magentas en inflorescencias terminales. Fruto cápsula cilíndrica, péndula. Semillas membranosas, dialadas. Originaria desde México hasta el noroeste argentino e islas del río Uruguay. Florece en setiembre antes de emitir las hojas.

Usos

Uso en parques, plazas, como ejemplar aislado o en alineaciones urbanas.

Requerimientos

Pleno sol, no tolera sombra densa. Heladas ocasionales, pero no frecuentes o severas. Prefiere suelos profundos, fértiles, bien drenados, con abundante materia orgánica y ligeramente ácidos o neutros. Requiere buen drenaje.

Tolerancias

Apto para cultivo urbano en regiones cálidas, tropicales y subtropicales. Tolerancia a la sequía y heladas una vez establecido.

Paleta cromática



Lapacho rosado (*Handroanthus impetiginosus*)

Fase de producción	Descripción
Reproducción por	Sembrar inmediatamente después de cosechadas, germinación escalonada. Las provenientes de partes altas de la copa tienen mayor índice de germinación.
Siembra o enraizamiento	Sembrar en sustratos con arcilla y abundante materia orgánica. De ser posible, sembrar y mantener a temperaturas mayores a 20°C.
Planta juvenil	Transplantar 2 o 3 semanas luego de la germinación.
Incremento de tamaño	Crecimiento rápido, a los 8 meses se encuentra apto para trasplante definitivo.
Conducción y poda	Cuidar las raíces, ya que tienden a enredarse por dominancia apical, brindar espacio o utilizar macetas que no permitan que esto suceda.
Riego y calidad agua	No regar en exceso, provoca la caída de hojas y favorece pudrición de raíces.
Fertilización	Utilizar fertilizantes de liberación lenta.
Control de malezas	Usar sustratos limpios y control manual sobre todo en etapas iniciales del cultivo.
Manejo fitosanitario	Susceptible a pulgones, moscas blancas, enfermedades del suelo. Si no se hace un control adecuado de insectos puede aparecer fumagina.
Transporte / Comercialización	Comercialización en envase rígido o bolsa de 15 a 35 litros. Durante el transporte no deben exponerse al sol, vientos ni heladas, cubriendo la carga con lona o toldo para evitar la desecación y el daño mecánico por viento. Atar ramas para optimizar espacio de carga.

- Material elaborado por el Grupo Disciplinar de Paisaje del Departamento Forestal en el marco del **proyecto Innovagro FSA20241180511**