

Pindó (*Syagrus romanzoffiana*)

Grupo funcional: Palmeras ornamentales

Descripción

Palmera arbórea monoica de 10 a 25 metros de altura. Tronco liso anillado. Hojas pinnadas espiraladas de más de 3 metros de longitud, de color verde oscuro cuando maduras. Segmentos largos flexibles a lo largo del raquis. Flores unisexuales en panojas amarillentas de 1,5 metros. Fruto drupa de color anaranjado intenso. Florece y fructifica primavera-verano. Cultivada mundialmente. Nativa de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Usos

Aislada o en grupos donde se destaque su follaje y estípites. Grupos mixtos con otras especies de palmeras y arbustos lograr efectos naturales.. Alineaciones, avenidas o delimitaciones de espacios.

Requerimientos

Lugares soleados. Suelos drenados ricos en materia orgánica. Crecimiento lento.

Tolerancias

Heladas moderadas y vientos.

Paleta cromática



Pindó (*Syagrus romanzoffiana*)

Fase de producción	Descripción
Reproducción por	Por semillas:evitar recolección de racimos enfermos o de semillas pequeñas. Extracción de frutos con agua y detergente, saponificar antes de la siembra. Tratamiento previo de las semillas con solución fungicida química u orgánica (aceite de neem 10 ml, bicarbonato de sodio 0,7 g, jabón en polvo baja espuma 11 gl-1 de agua) durante dos horas, luego secar.
Siembra o enraizamiento	Escarificación de las semillas colocándolas en detergente entre 60 y 70 grados durante una semana. Siembra en almácigos o bandejas con sustrato humedecido.
Planta juvenil	Realizar el primer trasplante con la aparición de la primera hoja. Se sugiere respetar el nivel del cuello del plantín una vez trasplantado.
Incremento de tamaño	Cultivo en contenedores de 3 litros de capacidad implementando sustrato com- puesto por 60% de humus, 20% perlita, 20% cascarilla de arroz, con agregado de fertilizante rico en fósforo. En un plazo de 16 a 18 meses puede alcanzar una altura de 50 cm. Cría a campo, suelo drenado asegurando aireación en los primeros 75 cm de profundidad.
Conducción y poda	No requiere de conducción. Poda de limpieza y hojas secas.
Riego y calidad agua	Riegos frecuentes en ambientes calurosos, cada 3 o 4 días, complementando con pulverizaciones. Verificar previamente drenaje de los contenedores para evitar excesos de agua. En invierno un riego semanal suele ser suficiente.
Fertilización	Más allá de la fertilización inicial, pulverizar en los meses de invierno con fertilizante foliar para la prevención en la carencias de micronutrientes.
Control de malezas	Controlar sustratos, uso de coberturas para sombreado.
Manejo fitosanitario	Manchas foliares por hongos del género <i>Colletotrichum</i> . Ataques de cochinillas en la base de las hojas, que pueden tornarse graves.
Transporte / Comercialización	Contenedores rígidos de 10, 20 y 50 litros.

- Material elaborado por el Grupo Disciplinar de Paisaje del Departamento Forestal en el marco del **proyecto Innovagro FSA20241180511**