

# Pitosporo enano (*Pittosporum tobira nana*)

Grupo funcional : Arbustos ornamentales

## Descripción

Arbusto perenne pequeño, denso y de crecimiento lento de 0.5 a 1 metros de ancho y altura. Hojas coriáceas, brillantes, obovadas. Flores pequeñas, fragantes, en umbelas terminales grandes, blancas, que amarillean pronto. Florece a finales de la primavera e inicios del verano. Frutos en forma de cápsula, verdes a marrones, con semillas rojas.

Pittosporaceae es una familia nativa de Japón, de la que se seleccionó esta variedad de hábito arbustivo denso.

## Usos

Especie utilizada en parques y jardines, principalmente en grupos o cercos vivos, aunque también puede cultivarse como ejemplar individual debido a su forma globosa compacta.

Suele implementarse en macetas creando puntos focales. Su follaje verde intenso permite su combinación con una amplia variedad de arbustos y herbáceas.

## Requerimientos

Suelo con buen drenaje, no exigente en pH. Se puede cultivar al sol en semisombra.

## Tolerancias

Resistente a sequía, heladas y a salpicaduras de agua salada.

## Paleta cromática



## Pitosporo enano (*Pittosporum tobira nana*)

| Fase de producción            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reproducción por              | Por esquejes: tomarlos de ramas del año de 4 a 5 cm, colocarlos en arena gruesa, dejando uno o dos pares de hojas. Las variedades verdes o de hojas grandes enraizan con más facilidad.<br>Por semillas: retirarlas cuando abren las cápsulas, lavar con agua jabonosa y sembrar.                                                                                                     |
| Siembra o enraizamiento       | Colocar los esquejes en turba o espuma fenólica. El enraizado toma de 8 a 12 semanas a bajo temperaturas de 12 a 20°C. Descartar estacas que pierdan las hojas.                                                                                                                                                                                                                       |
| Planta juvenil                | Trasplantar las estacas enraizadas y los plantines procedentes de semilla luego de que desarrollen de 2 a 4 hojas verdaderas. Se pueden injertar variedades sobre <i>P. tenuifolium</i> , que tardan de 4 a 6 semanas en cicatrizar. Si se usó espuma fenólica, tomar los recaudos necesarios para minimizar los daños mecánicos. Descartar los esquejes que hayan perdido las hojas. |
| Incremento de tamaño          | Usar sustratos levemente ácidos con compost, asegurar buen drenaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conducción y poda             | Poda de formación. Tener en cuenta si se dejará florecer o se usará dándole una forma específica.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Riego y calidad agua          | Sensible al exceso de agua. Evitar aguas alcalinas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fertilización                 | A la salida del invierno realizar fertilización completa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Control de malezas            | Controlar sustratos, tener en cuenta el crecimiento lento de las plantas de semilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Manejo fitosanitario          | Favorecer la ventilación todo lo posible para prevenir ataques de cochinillas. Cuidar el exceso de riego para evitar podredumbres por hongos el suelo.                                                                                                                                                                                                                                |
| Transporte / Comercialización | La comercialización ofrece amplia diversidad de contenedores según el tamaño del ejemplar, principalmente envases de 2 a 5 y 10 litros.                                                                                                                                                                                                                                               |

- Material elaborado por el Grupo Disciplinar de Paisaje del Departamento Forestal en el marco del **proyecto Innovagro FSA20241180511**